



Lic. Irma Villegas Torrico, PROSALUD

Lic. Mery Yupanqui Huayta, Hospital Maria Daza C. Minero

Cualquier error u omisión es responsabilidad de los autores.

EQUIPO DE REDACCION DEL DOCUMENTO

Cristina Herdman, PATH

Karen Levin M.S.W., EngenderHealth

Ilana Dzuba, M.H.S., EngenderHealth

Wendy Castro, M.H.S., PATH

Por favor envíe una copia de cualquier adaptación de éste material a:

Índice

Prefacio


Paracetamol 39



vagina. Estas bacterias producen gases de un olor especialmente fétido

elaborar disolviendo de 5 a 10 pastillas aplastadas de metronidazol de 200 mg en 500 ml en agua limpia (hervida y fría). Este paquete de tela

comunes son: fl



PRECAUCIÓNrriana, 1992.

IMPORTANTE: Adapte la bebida a su área. Si los recipientes para medir litros o cucharas no están disponibles en la mayoría de las casas, ajustar las cantidades a las medidas y formas locales. Donde tradicionalmente se preparan cereales espesos para las personas enfermas, añada suficiente agua para hacerlo más líquido, y use esto. Busque la manera más rápida y fácil.

* Adaptada de *Donde no hay Doctor*, La Fundación Hesperiana, 1992.



4. Las tabletas de 2 mg de loperamida pueden aliviar la diarrea.

5. Si hay sangre mezclada con las heces (y si esta sangre no proviene de la vagina/cuello del útero) o si hay fiebre (y si no es malaria) si

hay

fi

estomacales. Los antibióticos deben continuarse por dos semanas luego





Si una mujer presenta úlceras:

1. Cuando se cambie de posición, evitar que se recueste directamente sobre cualquiera de las úlceras.
2. Lavar las úlceras dos veces al



Organización Mundial de la Salud que consideran qué es útil para ofrecer atención paliativa. Sólo se listan los fármacos que están disponibles y cuya efectividad ha sido probada.

Los analgésicos de potencia variada también son efectivos para aliviar el dolor (ver Tabla 1). Si es posible, debe ofrecerse a intervalos regulares, la menor cantidad de medicamentos de la potencia apropiada, para que el dolor pueda ser eliminado por completo. Si el dolor no

3. *Dosis a la hora de dormir.* Dormir puede ser un problema cuando un medicamento necesita ser administrado en cortos intervalos menores a ocho horas (por ej. cada 4 o 6 horas). En lugar de despertar a la paciente (y al que le cuida) durante la noche, para darle una dosis de analgésico, puede duplicarse la dosis del medicamento a la hora de acostarse. Esto generalmente previene el dolor sin perturbar el sueño.

4. *Fármacos de ayuda.* También pueden suministrarse otros fármacos que pueden ayudar en el dolor de los nervios o huesos. Algunas veces el cáncer de cue4.43.6(8.5(l)10.9(o)0.3(u)18(t)19(e)7.7(r)-13.9(i)-13.4(n)9.9(o en s -2910.6(u)2-5(a)-14.nhu do 716.6(l)-6.7m9(e)4.8(-14.d(i)-13.7(i)7.c5(a)-14.m9(e)4.8-14.2()5

Para ayudar a las mujeres con cáncer de cuello uterino avanzado y a los






Comunicándose con una Mujer Enferma y su Familia

- Empiece hablando de temas generales antes de pasar a temas más personales.

Es importante respetar valores culturales y tradiciones, pero también es importante saber que se puede complicar la situación o aún volverla dañina. A través del tiempo, la mayoría de las mujeres que están enfermas con cáncer de cuello uterino que están muertas y que u- en m.828(do)8.7(a)772(d)y hm.828(a)78(cei)7.2r (p)11.2(I1416au)-14.4nm.82

Una persona puede sufrir de depresión clínica si presenta varias de estas señales:





sábanas. Es muy importante explicar estas cosas a los familiares de la mujer enferma y a los que la cuidan para que sepan qué esperar y cómo







Plan de Cuidados Paliativos: (Liste cada queja/diagnóstico)

