

Manejo sintromico de infecciones comunes del tracto genital inferior

Síndrome	Síntomas	Hallazgos en el examen con espéculo	Tipo de infección	Tratamiento
Síndrome de flujo vaginal	Flujo vaginal anormal, irritación vulvar, picor	<p>Flujo vaginal blanco que puede verse en la vulva y con un olor vaginal anormal.</p> <p>Flujo amarillo o purulento. El cuello uterino puede presentar hemorragias puntiformes, dando lugar a lo que se ha denominado "cuello uterino en fresa".</p> <p>Blanco-grumosa o cremosa y espesa. El flujo no siempre tiene apariencia grumosa (a veces se describe como de carácter similar al de leche cortada), sino que puede variar de acuosa a homogéneamente espesa.</p>	<p><i>Vaginosis bacteriana (VB):</i> <i>Alteración polimicrobiana de la flora vaginal</i></p> <p><i>Trichomonas Vaginalis (TV)</i></p> <p><i>Candidiasis</i></p>	<p>El tratamiento debe abarcar la VB, la TV y la Candidiasis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metronidazol 400 mg o 500 mg, por vía oral, dos veces al día durante 7 días o Clindamicina 300 mg, por vía oral, dos veces al día durante 7 días ○ • Metronidazol 2 gramos, vía oral, dosis única <p>Y</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fluconazol 150 mg (o 200 mg), vía oral, dosis única ○ • Óvulo vaginal de miconazol, 200 mg insertado por la noche durante 3 noches ○ • Comprimido vaginal de clotrimazol, 100 mg, insertado por la noche durante 7 noches

<i>Infección del cuello uterino</i>	Alrededor del 50% de las mujeres pueden ser asintomáticas, otras pueden experimentar dispareunia y disuria, a veces flujo vaginal	Flujo cervical purulento en el examen con espéculo; cuello uterino inflamado/eritematoso	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> (o <i>gonococo</i>) <i>Chlamydia trachomatis</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ceftriaxona 250 mg, intramuscular, dosis única más Azitromicina 1 gramo, vía oral, dosis única ○ • Cefixima 400 mg, vía oral, dosis única más Azitromicina 1 gramo, vía oral, dosis única
<p>*Para las personas con síntomas de flujo vaginal, la OMS recomienda el tratamiento para <i>N. gonorrhoeae</i> y/o <i>C. trachomatis</i> y/o <i>T. vaginalis</i> durante la misma visita cuando no se dispone de pruebas moleculares.</p>				

Ref: Guidelines for the management of symptomatic sexually transmitted infections. Geneva: World Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO, disponible en <https://www.who.int/publications/i/item/9789240024168> (disponible en inglés).