

## Prise en charge syndromique des principales infections génitales basses

| Syndrome                   | Symptômes   | Observations lors de l'examen au spéculum  | Type d'infection  | Traitement   |
|----------------------------|---|--|---|--|
| Écoulement vaginal anormal | Écoulement vaginal anormal, irritation de la vulve, démangeaisons | <p>Sécrétions vaginales blanches, visibles sur la vulve et à l'odeur anormale</p> <p>Sécrétions jaunes ou purulentes, présence parfois d'hémorragies punctiformes sur le col de l'utérus lui donnant un aspect « framboisé ».</p> <p>Sécrétions pâteuses, blanches ou crémeuses, et épaisses. Les sécrétions ne sont pas toujours pâteuses (parfois décrites comme du lait caillé); elles peuvent être de texture liquide à uniformément épaisse</p> | <p><i>Vaginose bactérienne (VB) : déséquilibre polymicrobien du microbiome vaginal</i></p> <p><i>Trichomonase vaginale (TV)</i></p> <p><i>Candidose</i></p> | <p>Le traitement doit couvrir la BV, la TV et la candidose</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Métronidazole 400 à 500 mg, voie orale, deux fois par jour pendant 7 jours ; ou clindamycine 300 mg, voie orale, deux fois par jour pendant 7 jours</li> </ul> <p>OU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Métronidazole 2 g, voie orale, une seule dose</li> </ul> <p><b>ET</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fluconazole 150 mg (ou 200mg), voie orale, une seule dose</li> </ul> <p>OU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pessaires vaginaux contenant du miconazole, 200 mg à insérer la nuit pendant 3 nuits</li> </ul> <p>OU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprimé vaginal de clotrimazole, 100 mg, à insérer la nuit pendant 7 nuits</li> </ul> |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <b>Cervicite infectieuse</b>  | Asymptomatique chez environ 50 % des femmes, tandis que d'autres présentent une dyspareunie et une dysurie, parfois des pertes vaginales | Ecoulement cervical visible lors de l'examen au spéculum, inflammation/érythème du col de l'utérus | <i>Neisseria gonorrhoeae</i><br><br><i>Chlamydia trachomatis</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceftriaxone 250 mg, en intramusculaire, une seule dose <i>plus</i> azithromycine 1 g, voie orale, une seule dose</li> </ul> <p>OU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Céfixime 400 mg, voie orale, une seule dose <i>plus</i> azithromycine 1 g, voie orale, une seule dose</li> </ul> |
| <p><b><i>*En cas de pertes/sécrétions vaginales anormales, l'OMS recommande d'administrer un traitement contre N. gonorrhoeae et/ou C. trachomatis et/ou T. vaginalis lors de la même consultation, en l'absence de test de biologie moléculaire.</i></b></p> |  |  |  |  |

Référence : Guidelines for the management of symptomatic sexually transmitted infections. Genève : Organisation Mondiale de la Santé ; 2021. Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO, disponible sur <https://www.who.int/publications/i/item/9789240024168>.