

Синдромне лікування поширених інфекцій нижніх статевих шляхів

Синдром	Симптоми	Висновки при дослідженні дзеркала	Тип інфекції	Лікування
Синдром вагінальних виділень	Виділення з піхви, подразнення вульви, свербіж	<p>Білі вагінальні виділення, які можна побачити на вульві, і з абнормальним тт вагінальним запахом</p> <p>Жовті або гнійні виділення, шийка матки може мати точкові крововиливи, що спричиняють так звану «полуничну шийку матки».</p> <p>Сирноподібні, білі або кремоподібні і густі, виділення не завжди сирноподібні (іноді описуються як сирні за характером), але можуть варіюватися від водянистих до однорідно густих.</p>	<p><i>Бактеріальний вагіноз (БВ): полімікробний розлад вагінального мікробіому</i></p> <p><i>Вагінальна трихомонада (ТВ)</i></p> <p><i>Кандидоз</i></p>	<p>Лікування повинно охоплювати БВ, ТВ та кандидоз</p> <ul style="list-style-type: none">• Метронідазол 400 мг або 500 мг перорально двічі на день протягом 7 днів або кліндаміцин 300 мг перорально двічі на день протягом 7 днів <p>АБО</p> <ul style="list-style-type: none">• Метронідазол 2 г, перорально, разова доза <p>Також</p> <ul style="list-style-type: none">• Флуконазол 150 мг (або 200 мг), перорально, разова доза <p>АБО</p> <ul style="list-style-type: none">• Вагінальні песарії(супозиторії) міконазолу, 200 мг, введені на ніч на 3 ночі <p>АБО</p> <ul style="list-style-type: none">• Вагінальна таблетка клотримазолу, 100 мг, введена на ніч на 7 ночей

Інфекція шийки матки	Близько 50% жінок можуть мати безсимптомний перебіг, інші можуть відчувати диспареунію та дизурію, іноді вагінальні виділення	Гнійні виділення з шийки матки при дослідженні в дзеркалах, запалена/еритематозна шийка матки	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> <i>Chlamydia trachomatis</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Цефтриаксон 250 мг внутрішньом'язово, разова доза плюс азитроміцин 1 грам, перорально, разова доза <p>АБО</p> <ul style="list-style-type: none"> • Цефіксим 400 мг, перорально, разова доза плюс азитроміцин 1 грам, перорально, разова доза
<p>*Для людей із симптомами вагінальних виділень ВООЗ рекомендує лікування <i>N. gonorrhoeae</i> та/або <i>C. trachomatis</i> та/або <i>T. vaginalis</i> під час того самого відвідування, якщо молекулярні методи дослідження недоступні.</p>				

Посилання: Інструкції з лікування симптоматичних інфекцій, що передаються статевим шляхом. Женева: Всесвітня організація охорони здоров'я; 2021. Ліцензія: CC BY-NC-SA 3.0 IGO, доступний за адресою <https://www.who.int/publications/i/item/9789240024168>.