

Синдромное лечение распространенных инфекций нижних половых путей

Синдром	Симптомы	Результаты осмотра с использованием зеркала	Вид инфекции	Лечение
Синдром вагинальных выделений	Выделения из влагалища, раздражение вульвы, зуд	<p>Белые выделения из влагалища, которые можно увидеть на вульве, с аномальным запахом из влагалища.</p> <p>Желтые или гнойные выделения, из шейки матки могут наблюдаться точечные кровотечения, в результате чего возникает так называемая «клубничный вид» шейки матки.</p> <p>Творожные, белые или сливочные и густые выделения. Выделения не всегда имеют творожистый характер, могут варьироваться от водянистых до однородно густых.</p>	<p><i>Бактериальный вагиноз (БВ): полимикробное нарушение микробиота влагалища.</i></p> <p><i>Trichomonas Vaginalis (ТВ)</i></p> <p><i>Кандидоз</i></p>	<p>Лечение должно охватывать БВ, ТВ и кандидоз.</p> <ul style="list-style-type: none"> Метронидазол 400 или 500 мг перорально два раза в день в течение 7 дней или клиндамицин 300 мг перорально два раза в день в течение 7 дней. <p>ИЛИ</p> <ul style="list-style-type: none"> Метронидазол 2 грамма, перорально, разовая доза <p>И</p> <ul style="list-style-type: none"> Флуконазол 150 мг (или 200 мг) перорально однократно <p>ИЛИ</p> <ul style="list-style-type: none"> вагинальные пессарии с миконазолом по 200 мг на ночь в течение 3 ночей. <p>ИЛИ</p> <ul style="list-style-type: none"> Клотримазол вагинальные таблетки, 100 мг, на ночь в течение 7 ночей

Инфекция шейки матки	Приблизительно у 50% женщин могут протекать бессимптомно, у других может наблюдаться диспареуния и дизурия, иногда выделения из влагалища.	Гнойные выделения из шейки матки при осмотре с использованием зеркала, воспаленная/эритематозная шейка матки	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> <i>Chlamydia trachomatis</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Цефтриаксон 250 мг внутримышечно разовая доза плюс 1 грамм азитромицина перорально разовая доза <p>ИЛИ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Цефиксим 400 мг перорально разовая доза плюс 1 грамм азитромицина перорально разовая доза
<p>* Людям с симптомами выделений из влагалища ВОЗ рекомендует лечение <i>N. gonorrhoeae</i> и/или <i>C. trachomatis</i> и/или <i>T. vaginalis</i> во время одного визита, в случае отсутствия молекулярных тестов.</p>				

Ссылка: Рекомендации по ведению симптоматических инфекций, передаваемых половым путем. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2021. Лицензия: CC BY-NC-SA 3.0 IGO, доступно по адресу <https://www.who.int/publications/i/item/9789240024168>.