

病人姓名 \_\_\_\_\_ 卫生中心 \_\_\_\_\_

病 例

## 阴道镜检查、活检和可能治疗的知情同意书

子宫颈癌是在我们地区妇女中所出现的问题，但用简单的方法多数可能被预防，临床医师用此试验可以早期发现问题，如果这些问题早期发现、早期治疗，癌是可以避免的。

### 程序

你的宫颈可能有问题，所以你转来做阴道镜检查，如果你决定参加此检查，临床医师将提供有关宫颈癌有关的咨询和教育资料，问你一些问题、生育史和有无妊娠，并检查你的宫颈，将用窥阴器扩开阴道。然后，医师用醋酸轻轻地涂在宫颈上，你可能会感到醋酸的针刺感，临床医师用阴道镜观察宫颈，放大和照明宫颈以帮助医师清楚地检查宫颈。阴道镜不会接触你的身体，检查约5~7分钟。如果阴道镜检查你的宫颈正常，检查结束。如阴道镜检查你的宫颈不正常，医师将取一块宫颈组织（称活检），以便核实诊断。活检可以引起一些疼痛持续几秒钟，轻度的夹到痉挛的感觉。活检后将用冷冻治疗去除你宫颈的病变区，冷冻期间和冷冻后会感到一些痉挛，治疗后很快好转。疗后1~2周有点滴或少量出血，水样白带持续2~4周。禁止性交3~4周，以使宫颈很好地恢复。治疗后9~12个月需回来随诊。医师用阴道镜再检查你的宫颈，以确定治疗是否成功，如果阴道镜检查治疗没有成功，你将要进一步治疗。

### 危险性

阴道镜检查时你可能会有不适感，阴道镜检查可引起阴道刺激和烧灼感数分钟。如果取宫颈活检，1~2天内可能有少量阴道出血；若行冷冻治疗，4周内可能有水样白带。尽管不常见，你可能有严重的阴道出血。即使正确应用，无效的可能性也会有10%，但最后结果将在随诊9~12个月后决定。

### 入选对象

如有怀孕机会的妇女检查前，将有一系列问题询问决定是否入选。如果那样，你要做标准的尿妊娠试验，不管你是否妊娠，你将做阴道镜检查。如果需要治疗和妊娠试验阳性，将延至分娩后6周再行治疗。

### 保密

你所有的个人情况将予以保密，仅用于医疗保健，用于其他情况需要你签知情同意书。如果你拒绝其中的检查部分，将不会影响今后对你的病案管理。

## 问题

关于上述检查或你有权作为病人向地区医院直接提出任何问题，


## 病人声明（供给者副本）

上述阴道镜检，活检和可能的治疗情况已向我解释，已给我机会提问题。  
我同意参加这项检查

\_\_\_\_\_

病人签字

或病人手印 →



日期 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

证人签字

日期 \_\_\_\_\_

-----

(虚线以下撕下给病人)


## 病人声明（病人副本）

上述阴道镜检、活检和可能的治疗情况已向我解释，已给我机会提问题。  
我同意参加这项检查

\_\_\_\_\_

病人签字

或病人手印 →



日期 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

证人签字

日期 \_\_\_\_\_