

附录5

改良Reid阴道镜评分 (RCI)*

改良 Reid 阴道镜评分 (RCI) *

阴道镜特征	0分	1分	2分
颜色	轻度 醋白（不完全不透明）；模糊醋白；透明的或半透明醋白醋白超过转化区雪白伴表面发亮	中等程度阴暗灰/白色和发的表面（多数病变应在此类评分	污浊，不透明,牡蛎白色，灰色
病变边界和表面轮廓	微小湿疣样或微小乳头状表面轮廓 ¹ ；病变扁平边界模糊羽毛状或细小扇贝状，边界，呈角状，锯齿状 ³ ；转化区外的卫星样病变	病变规则，表面光滑均匀,轮廓清晰	边缘卷曲 ² ，,不同阴道镜表现区域之间有内部界限（中央为高度病变周围为低度病变）
血管	细小/一致的血管口径 ⁴ ，密集而均匀区域；细小的构形差的和/或 P 和/或 M；血管超出转化区边界；在微小湿疣样或微小乳头病变中有细小血管 ⁶	缺乏血管	明显粗大的 P 或 M，边界锐利 ⁵ ，不规则和范围广
碘染色	阳性吸碘呈赤褐色-棕色；无意义病变的阴性吸碘为黄色，病变评分≤3分；阴道镜下转化区边缘的明显碘阴性区（常常由于角化不全引起）	部分吸碘，斑驳状，斑点状表现	有意义病变的阴性吸碘区为黄色，病变按上述评分≥4分

*用 5%醋酸后和 Lugol 碘溶液后阴道镜分级（见附件 3 “5%醋酸和 Lugol 碘液的配方”）

1. 表示阴道镜下明显癌的微小外生型表面轮廓不包括在此分类表中
2. 上皮边缘与间质分离而卷曲。注意：明显的低度病变通常被过高的解释，而难以判断的无血管斑片的高度鳞状上皮内病变（HSIL）又可能容易被漏诊。
3. 即使周边部分有直线走向，评分为 0。
4. 有时，镶嵌有中央毛细血管是低度组织学异常的特征，这些低度病变的毛细血管可能是十分明显的，如不能区分细小血管形态和粗大的血管，则会过度诊断。
5. 阴道镜下为明显癌的树枝状不典型血管不包括此分类表中。
6. 通常较明显的微小湿疣病变评分低。但癌也可能像湿疣样，尽管这种情况少见。
7. 角化不全：是含固缩核的角化细胞表层区域

应用 Reid 阴道镜评分 (RCI) 阴道镜预示的组织学诊断

RCI (总分)	组织学
0~2	CIN1
3~4	重叠的病变: CIN1 或 CIN2
5~8	CIN2-3

(译者 章文华)